

VAŽNO

Ako imate pitanja ili vas nešto brine,
obratite se izabranom pedijatru/obiteljskom
liječniku ili patronažnoj službi!

Kroz ponavljanje rutina (hranjenje, spavanje, maženje) i vašu odgovorljivost (javite joj se kad se glasa ili plače, uzmete je u ruke kako biste je utješili, pričajte joj, smiješite se), vaša beba će se osjećati sigurnom i zadovoljnom.

Ovo je razdoblje učestalijeg plakanja. Ako ste učinili sve kako bi se beba osjećala ugodno – nahranili ste je, presvukli, pokušali je umiriti – a ona i dalje plače, prigrilate je nježno i smireno, tihoj je govorite i pokušajte je smiriti.



KALENDAR CIJEPLJENJA						
CJEPIVO	NAVRŠENA DOB					
	0	2	4	6	1	5
BCG	BCG					
HIB		HIB	HIB	HIB	HIB	
DI-TE-PER		DTPa	DTPa	DTPa	DTPa	DTPa
POLIO		IPV	IPV	IPV	IPV	
DI-TE						
MO-PA-RU					MPR	
HEPATITIS B		HBV	HBV	HBV	HBV	
Pn	Pn	Pn			Pn	

BCG - cjepivo protiv tuberkuloze
HIB - cjepivo protiv haemofilusa influenze tipa B
DI-TE-PER - cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (hripavca)
POLIO (IPV) - cjepivo protiv dječje paralize (inaktivirano)
MO-PA-RU - cjepivo protiv morbilija (ospica), parotitisa (zaušnjaka) i rubeole
DI-TE - cjepivo protiv difterije i tetanusa
HEPATITIS B - cjepivo protiv hepatitisa B
Pn - cjepivo protiv pneumokoka

Pilot-program „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“ financiran je sredstvima Europske unije, a Médecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW je provedbeni partner Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (Ured UNICEF-a za Hrvatsku).

Informacije i stavovi sadržani u ovom letku pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije, ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje.



ŠTO MOŽE
VAŠA BEBA

U DOBI OD
2 MJESECA



ŠTO VEĆINA BEBA MOŽE U DOBI OD 2 MJESECA

- Kad ne plače, proizvodi druge glasove.
- Gleda u lica jer su joj zanimljiva.
- Gleda nekoliko sekundi u igračku.
- Plaćem beba šalje poruku da je gladna ili nezadovoljna.
- Ako se glasa i smiješi dok joj se govori, pokazuje da je zadovoljna.
- Voli da je se nosi.
- Dok leži na trbuhi, kratko može podignuti glavu.
- Pomiče ruke i noge.
- Nakratko otvara šaku.

KAKO MAMA I TATA MOGU POMOĆI?

- Govorite svojoj bebi, pa pričekajte njezinu reakciju.
- Govorite joj s lijeve i desne strane, kako bi okretala glavu prema vama. Pokušajte isto sa zvečkom.
- Kad pričate svojoj bebi, puno se smiješite i pjevajte.
- Kad vaša beba plače, javite joj se da vas čuje i vidi, pa je onda uzmите u ruke.
- Kad se vaša beba glasa, poslušajte je. Kad zastane, vi počnite govoriti, pjevati ili oponašati bebin govor.
- Nosit ćete je na način da je uz vas, ljaljuškajte je uz pjevanje.
- Kad presvlačite svoju bebu, pomozite joj da vrijeme kratko provede i na trbuhi.
- Na ručni zglob možete staviti crvenu traku koju vaša beba može lako uočiti.



DNEVNA RUTINA

Prilikom presvlačenja i hranjenja pričajte svojoj bebi. Stavite je kroz dan nakratko na bok ili trbuh.

Ako beba pokazuje interes za igru, pokažite joj zvečku ili neki drugi, jednako zanimljiv predmet.

Kad vaša beba pokazuje interes za time, pokažite joj zvečku ili neki drugi zanimljivi predmet.

Kad vaša beba plače, javite joj se kako bi znala da ste joj blizu.

Kad je vaša beba budna i zadovoljna, slušajte kako „priča“, pa joj se javite i nasmiješite. Pjevajte joj i pričajte.

Mazite svoju bebu, masirajući joj ruke, stopala i obraze.

